
Diagnostic d'œdème vs accumulation du médicament



Vidéo d'avis d'expert. Cliquez ici.
Debra Johnston, inf. aut.
Isabelle Beaulieu-Boire, Neurologue


Caractéristiques

- **Œdème** : Accumulation ou rétention de liquide dans les couches de la peau ou sous la peau, entraînant une enflure visible[1].
- L'œdème peut être généralisé ou localisé, et il peut apparaître soudainement ou de manière insidieuse (ce qui est plus fréquent). Si l'œdème se développe lentement au fil du temps, il peut atteindre une ampleur considérable avant que le patient n'aille consulter[2].
- Il est doux au toucher et, si l'on appuie dessus, il peut se former une indentation, ou « dépression », qui disparaît une fois la pression relâchée[1].
- L'**accumulation du médicament** est une accumulation du médicament sous la peau, autour du point de perfusion. Elle se manifeste généralement par une zone de peau surélevée, accompagnée ou non d'une induration, et peut être le signe d'une réduction de l'absorption.











1. Ellenson S. Subcutaneous edema: symptoms, causes, and treatment. Tactile Medical. Publié le 22 mai 2023. Consulté le 27 novembre 2024 au tactilemedical.com/resource-hub/cellulitis-and-edema/subcutaneous-edema-symptoms-causes-and-treatment/;
2. Thompson AD, Shea MJ. Œdème. Le Manuel MSD – Version pour professionnels de la santé. Révisé en août 2024. Consulté le 27 novembre 2024 au www.msdmanuals.com/professional/cardiovascular-disorders/symptoms-of-cardiovascular-disorders/edema.