
Diagnostic et prise en charge de la douleur au point de perfusion

Causes possibles*

- Canule trop longue.
- Tissu sous-cutané mince.
- Mauvaise technique d'insertion.
- Canule délogée.



Éléments à prendre en considération et prise en charge

Douleur au point d'insertion de la canule +/- ecchymoses, mais pas d'autres changements cutanés

Envisager :

- Changer de point de perfusion.
- Utiliser une canule plus petite (plus courte)/changer de point de perfusion pour une région ayant des tissus adipeux plus profonds.

Douleur continue +/- ecchymoses, mais pas d'autres changements cutanés

Envisager :

- Mieux fixer la canule ou la tubulure.
- Changer de point de perfusion et surveiller l'apparition d'une rougeur, d'une enflure et l'augmentation de la douleur (canule déplacée ou début d'infection) à l'ancien point de perfusion.

Associée à d'autres changements cutanés – rougeur, enflure, mais absence de fièvre

Envisager :

- Surveiller la région après un changement de point de perfusion.

Associée à de la fièvre +/- TOUT changement cutané

Envisager :

- Commencer un traitement antibiotique et prendre rendez-vous pour une évaluation.



Vidéo d'avis d'expert. Cliquez ici.
Lynne H. Robertson, Dermatologue

*Avis d'expert de la Dre Lynne H. Robertson, octobre 2024.